

Příbalová informace: informace pro uživatele

neo-angin®

PASTILKY

TŘEŠEŇ

Dichlorbenzenmethanolum, Amylmetacresolum, Levomentholum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však neo-angin® třešeň musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu
- Požádejte svého lékaře, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 4-5 dnů, musíte se poradit s lékařem.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1. Co je neo-angin® třešeň a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete neo-angin® třešeň užívat.
3. Jak se neo-angin® třešeň užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak neo-angin® třešeň uchovávat
6. Další informace

1. CO JE NEO-ANGIN® TŘEŠEŇ A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Neo-angin® třešeň je vyráběn ve formě červených plochých, mírně průsvitných, kulatých pastilek. Jedna pastilka obsahuje dichlorbenzenmethanolum 1,2 mg, amylmetacresolum 0,6 mg, levomentholum 5,9 mg. neo-angin® třešeň má antiseptické účinky, zasahují široké spektrum známých bakterií, které vyvolávají záněty horních cest dýchacích.

Indikační skupina

Otorinolaryngologikum

neo-angin® pastilky třešeň se užívá k:

prevenci a k léčbě zánětlivých a infekčních onemocnění ústní a krční dutiny a hltanu. Užívá se při bolestech v krku, nachlazení, chrapotu, zánětech sliznice v ústní dutině (stomatitis, soor, afty), dásní (gingivitis), zánětu hltanu (faryngitis) a jako podpůrná léčba u angíny.

Při potížích s polykáním, je vždy třeba navštívit lékaře, kvůli možné angíně.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE NEO-ANGIN® TŘEŠEŇ UŽÍVAT

Neužívejte neo-angin® třešeň

Jestliže jste alergický(á) (hypersenzitivní) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku přípravku neo-angin® třešeň.

Jestliže vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí specifických typů cukrů.

Zvláštní opatření při použití přípravku neo-angin® třešeň je zapotřebí

Přípravek není vhodný pro děti do 6 let.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky není známo.

Prosím informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Užívání přípravku neo-angin® třešeň s jídlem a pitím

neo-angin® třešeň může být užíván nezávisle na jídle.

Těhotenství a kojení

Užívání se nedoporučuje.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek neovlivňuje schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku

Jestliže vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých typů cukrů nebo sladidel (např. glukóza, sukrosa, isomalt nebo maltitol), poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento lék užívat.



Přípravek neo-angin® třešeň obsahuje také 2,58 g isomaltu (to odpovídá 25 kJ v jedné pastilce). To by mělo být bráno v potaz u pacientů s diabetes mellitus. neo-angin® třešeň obsahuje barvivo ponceau 4R, které může vyvolat alergickou reakci.

3. JAK SE NEO-ANGIN® TŘEŠEŇ UŽÍVÁ

Vždy užívejte neo-angin® třešeň podle pokynů uvedených v této příbalové informaci. Jestliže si nejste jistý(á), zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Pokud není jinak předepsáno, nechají si dospělí a děti od 6 let pomalu rozpustit v ústech každé 2-3 hodiny 1 pastilku. Denně je možné užít maximálně 6 pastilek.

Délka léčby

Přípravek je určen ke krátkodobé léčbě akutních onemocnění.

Poradte se se svým lékařem, jestliže se příznaky zhorší a nebo nedojde k jejich zlepšení do 4-5 dnů.

Jestliže jste užil(a) více přípravku neo-angin® třešeň než jste měl(a)

Při předávkování vyhledejte ihned lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek neo-angin® třešeň

Jestliže jste zapomněl(a) užít neo-angin® třešeň, nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokračujte dále v užívání tak, jak je předepsáno.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Příležitostné alergické reakce dýchacích cest, žaludku a střev se projevují horečkou, třesavkou a průjmem.

Isomalt obsažený v tomto léku může mít mírně projímavý účinek.

Při výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí přestaňte lék užívat a poraďte se s lékařem.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahtasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK PŘÍPRAVEK NEO-ANGIN® TŘEŠEŇ UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25°C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Léčivými látkami jsou Dichlorbenzenmethanolum (1,2 mg v 1 pastilce), Amylmetacresolum (0,6 mg v jedné pastilce), Levomentholum (5,9 mg v jedné pastilce).

Pomocnými látkami jsou isomalt, kyselina vinná, třešňové aroma, sílice máty peprné, ponceau 4R, indigokarmín.

Jak přípravek vypadá a co obsahuje toto balení

Balení

24 a 48 červených plochých, mírně průsvitných, kulatých pastilek.

Obal

Průhledný PVC/PVDC/Al blistr, krabička.

Držitel rozhodnutí o registraci / Výrobce

Divapharma GmbH, D-12274 Berlin, Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

4 LIFE PHARMA CZ, s.r.o.

Ve Studeném 8a

147 00 Praha 7

Tato příbalová informace byla naposledy schválena

15.6.2015

