

Příbalová informace: informace pro uživatele

neo-angin®

PASTILKY

ŠALVĚJ

Dichlorbenzenmethanolum, Amylmetacresolum,
Levomentholum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však **neo-angin®** šalvěj musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu
- Požádejte svého lékaře, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3–4 dnů, musíte se poradit s lékařem.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci:

1. Co je **neo-angin®** šalvěj a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete **neo-angin®** šalvěj užívat.
3. Jak se **neo-angin®** šalvěj užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak **neo-angin®** šalvěj uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. CO JE NEO-ANGIN® ŠALVĚJ A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

neo-angin® šalvěj má antiseptické účinky a mírné analgetické účinky

Indikace:

Podpůrná léčba nekomplikovaných zánětlivých onemocnění hltanu, doprovázených typickými příznaky jako je bolest v krku, zarudnutí, mírné potíže s polykáním.

Bez doporučení lékaře by **neo-angin®** šalvěj neměl být používán déle než 3–4 dny.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE NEO-ANGIN® ŠALVĚJ UŽÍVAT

Neužívejte **neo-angin®** šalvěj

- jestliže jste alergický(á) (hypersenzitivní) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku přípravku **neo-angin®** šalvěj.
- jestliže máte zánět hltanu (projevuje se dráždivým kašlem, chraptivostí či ztrátou hlasu), chronický zánět hltanu, astma, přecitlivělost (alergie) na silice.

Přípravek není vhodný pro děti do 6 let.

Upozornění a opatření. Je-li přítomná nebo se objeví horečka nebo hnisavé povlaky na krčních mandlích, je nutné vyhledat lékaře.

Bez doporučení lékaře by **neo-angin®** šalvěj neměl být užíván déle jak 3–4 dny.

neo-angin® šalvěj obsahuje isomalt. Jestliže vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí specifických typů cukrů, poraďte se se svým lékařem, dříve než začnete tento lék užívat.

Další léčivé přípravky a **neo-angin®** šalvěj. Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky není známo.

Prosím informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

neo-angin® šalvěj s jídlem a pitím **neo-angin®** šalvěj se nedoporučuje užívat během jídla.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat

Nejsou k dispozici klinické údaje o podávání **neo-angin®**u šalvěj během těhotenství.

Studie na zvířatech nenaznačují přímé ani nepřímé škodlivé účinky na průběh těhotenství, vývoj zárodku nebo plodu, porod nebo postnatální vývoj (vývoj po narození).

Vzhledem k nedostatku informací nelze zcela vyloučit negativní působení na plod, proto není užívání během těhotenství nebo kojení doporučeno.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek neovlivňuje schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku

Jestliže vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých typů cukrů, poraďte se se svým lékařem, dříve než začnete tento lék užívat.

Přípravek **neo-angin®** šalvěj obsahuje také 2,58 g isomaltu (to odpovídá 25 kJ v jedné pastilce). To by mělo být bráno v potaz u pacientů s diabetem mellitus.

neo-angin® šalvěj obsahuje barvivo ponceau 4R, které může vyvolat alergickou reakci.

3. JAK SE NEO-ANGIN® ŠALVĚJ UŽÍVÁ

Vždy užívejte **neo-angin®** šalvěj podle pokynů uvedených v této příbalové informaci. Jestliže si nejste jistý(á), zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. Pokud není jinak předepsáno, nechají si dospělí a děti od 6 let pomalu rozpustit v ústech každé 2–3 hodiny 1 pastilku. Denně je možné užít maximálně 6 pastilek. Poradte se se svým lékařem, jestliže se příznaky zhorší a nebo nedojde k jejich zlepšení do 3–4 dnů.

Jestliže jste užil(a) více přípravku **neo-angin®** šalvěj než jste měl(a)

Žádné případy předávkování nebyly dosud popsány.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek **neo-angin®** šalvěj

Jestliže jste zapomněl(a) užít **neo-angin®** šalvěj, nezdvoujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Pokračujte dále v užívání tak jak je předepsáno.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek **neo-angin®** šalvěj nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Hodnocení nežádoucích účinků je založeno na následující četnosti výskytu:

Velmi časté:	více než 1 z 10 pacientů
Časté:	méně než 1 z 10 pacientů, ale více než 1 z 100 pacientů
Méně časté:	méně než 1 z 1000 pacientů, ale více než 1 z 10000 pacientů
Vzácné:	méně než 1 z 10000 pacientů, ale více než 1 z 100000 pacientů
Velmi vzácné:	méně než 1 z 100000 pacientů, není známo (z dostupných údajů nelze určit)

Velmi vzácné se mohou vyskytnout žaludeční obtíže, trávicí obtíže, podráždění dýchacích cest a podráždění ústní sliznice. Četnost není známa: Barvivo ponceau 4R může vyvolat alergickou reakci.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK PŘÍPRAVEK NEO-ANGIN® ŠALVĚJ UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a na blistru. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25°C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékaře, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek **neo-angin®** šalvěj obsahuje:

Léčivými látkami jsou Dichlorbenzenmethanolum (1,2 mg v 1 pastilce), Amylmetacresolum (0,6 mg v jedné pastilce), Levomentholum (5,9 mg v jedné pastilce).

Pomocnými látkami jsou silice máty peprné, isomalt, kyselina vinná, šalvějová silice, ponceau 4R (E 124), chinolinová žluť (E 104), patentní modř V (E131).

Jak přípravek vypadá a co obsahuje toto balení

Balení 12, 16, 24 a 48 medově zbarvených, bikonvexních, mírně průsvitných, kulatých pastilek.

Obal

Průhledný PVC/PVDC/Al blistr, krabička.

Držitel rozhodnutí o registraci / Výrobce

Divapharma GmbH, D-12274 Berlin, Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního

zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

4 LIFE PHARMA CZ, s.r.o., Ve Studeném 8a, 147 00 Praha 4

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 15.6.2015